

Dormir protege contra la emesis inducida por quimioterapia.

DOMINGUEZ ORTEGA-L, -CUBEDO CERVERA R, CORTES-FUNES H, DIAZ-GALLEGO E.

Cancer 1996; 77 (8) :1566-70

Servicio de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre, Madrid, España

Resumen:

ANTECEDENTES. Presentamos un ensayo clínico para evaluar la hipótesis de que la emesis relacionada con la quimioterapia se reduce cuando los medicamentos entregados, mientras el paciente está durmiendo. **MÉTODOS.** Los adultos sin trastornos del sueño de la inducción de vómito condiciones que iban a recibir sus primeros cursos de 100 mg/m² de cisplatino fueron incluidos. Hemos reducido la profilaxis que consta de antiemético ondansetrón y dexametasona en los siguientes grupos de pacientes. **RESULTADOS.** Veintiún personas fueron necesarios para disminuir la profilaxis antiemética a cero. Vómitos significativo se observó sólo cuando se abolió la profilaxis, pero no en pasos anteriores empleando despreciable dosis de profilaxis. **CONCLUSIONES.** Nuestros datos muestran que cuando el cisplatino se administra durante el sueño, la reducción de la profilaxis antiemética de identificación no se sigue por el previsible aumento de la toxicidad en emético. Esta propiedad antieméticos de sueño es, por lo que sabemos, no asignados de forma controlada. Un estudio más detallado de la utilidad clínica de este método en la prevención de la emesis relacionada con la quimioterapia está indicado.

Categoría: [Farmacología \(sólo esta semana\)](#)
Volver al [PNA más vistos](#)

Búsqueda por palabra clave:

Búsqueda